

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DLP 8-9-65 400

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC-ROUSSILLON

ABONNEMENT ANNUEL

(Tél. 72-58-72)

(AUDE, AVEYRON, GARD, HÉRAULT, LOZÈRE, PYRÉNÉES-ORIENTALES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. 16, rue de la République - MONTPELLIER.

C. C. P. : MONTPELLIER 5.238-57

15 F.

N° 60 - Septembre 1965/43

1er supplément

Zones 14-19

CULTURES LEGUMIÈRES DE PLEIN CHAMP

TOMATES DE CONSERVE

AVERTISSEMENT

Mildiou

A la faveur de la période pluvieuse qui affecte actuellement nos régions, les premiers foyers de mildiou peuvent apparaître dans quelques secteurs et plus particulièrement dans celui de BELLEGARDE qui est le plus menacé.

donc

Il est recommandé d'exécuter un traitement fongicide. Pour les secteurs qui ne sont pas encore menacés de mildiou ce traitement protégera les cultures des attaques d'*Alternaria* car Mildiou et *Alternaria* sont justiciables des mêmes fongicides.

Les produits qui paraissent actuellement les plus efficaces sont : le Mahèbe, le Mancozèbe, le Zinèbe, le Zirame, le Phaltane et les organo-cupriques riches en Zinèbe qui seront utilisés aux doses prescrites par les fabricants.

INFORMATIONS

Mildiou terrestre

Ce mildiou est appelé mildiou terrestre par opposition au mildiou "vrai". Il est provoqué par un champignon différent.

Le Mildiou terrestre attaque surtout les fruits proches du sol à la faveur des éclaboussures provoquées par les fortes pluies d'orage ou dans les parcelles humides lorsque l'eau des irrigations et des pluies stagne aux points les plus bas.

Les attaques n'ont lieu que sur des fruits verts et à la face inférieure en contact avec le sol ou regardant ce dernier. Les taches sur fruits sont nettement zonées et s'étendent rapidement.

Les tomates de conserve non palissées sont plus fréquemment atteintes que les tomates conduites sur tuteurs.

Les fongicides efficaces contre le Mildiou "vrai" le sont également contre le Mildiou terrestre mais il est difficile d'atteindre la face inférieure des fruits et à plus forte raison, impossible même, lorsque ces derniers touchent le sol. Il en découle qu'en pratique, les traitements sont parfois d'une efficacité réduite.

En général les attaques de Mildiou terrestre n'ont pas le caractère épidémique des attaques de Mildiou vrai, elles sont plus localisées.

L'Inspecteur : P. BERVILLE

P. CHRISTIAN,

Imprimerie de la Station d'Avvertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon
Le Directeur-Gérant ; L. BOUYX.

P 174